

PRECAUCIONES

CYPERKILL 25 EC, es un insecticida perteneciente al grupo químico de los piretroides.

- Mantener fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega fresca, seca, bien ventilada, segura y bajo llave.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protector facial completo o de nariz y boca, antiparras y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Asegurarse de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada y animales domésticos durante la aplicación.
- De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante su aplicación el operador debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
- Cuidar de no aplicar sobre cursos de agua y sobre insectos benéficos.

PRECAUCIONES DESPUES DE LA APLICACION

- Lavar bien su ropa y equipos de trabajo, con agua y detergente biodegradable. Verter este lavado, así como los sobrantes de líquidos de la pulverización, en suelos sin cultivar y lejos de cursos o fuentes de agua.
- Destruir el envase vacío. No reutilizar el envase.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia 10 - 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón alcalino.
- En caso de inhalación, poner al afectado en un lugar bien ventilado o al aire libre.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y dar a beber agua con carbón medicinal para absorber el insecticida. Mantenga al afectado boca abajo mientras consigue atención médica.
- Si se observan signos de intoxicación (náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea y ocular y dificultad respiratoria) debido al mal uso del producto o a descuidos, procurar atención médica inmediata y mostrar al facultativo la etiqueta del producto.

EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE INMEDIATAMENTE CON RITA-CHILE
AL : (2) 777 1994

- **SÍNTOMAS POSIBLES:** Irritación dermal, ocular y de las vías respiratorias, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, cefalea, vértigo, debilidad, temblores musculares y convulsiones.

- **ANTIDOTO:** No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

- **TIEMPO DE REINGRESO:** 120 minutos (60 minutos de buena ventilación)

- Fabricado y Distribuido por:
Agrícola Nacional S.A.C. e I.
Camino Noviciado Norte, Lote 73-B,
Lampa, Santiago - CHILE



INSECTICIDA PIRETROIDE • CONCENTRADO EMULSIONABLE

CYPERKILL[®] 25 EC



CYPERKILL 25 EC, es un insecticida piretroide de contacto e ingestión, recomendado para el control de plagas de insectos voladores y rastreros.



COMPOSICIÓN:

- Cipermetrina 250 g.
- Ingredientes inertes c.s.p. 1.000 cc.

Reg. I.S.P. N° P-101/09 **USO PROFESIONAL** **1 LITRO**

INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

CYPERKILL 25 EC, insecticida piretroide de contacto e ingestión, de baja toxicidad en mamíferos, elevada eficacia, alto rendimiento y largo efecto residual, especialmente recomendado para combatir insectos en: casas, edificios, restaurantes, hospitales, clínicas, hoteles, campañas municipales y programas gubernamentales, mataderos, frigoríficos, packing, lecherías, planteles avícolas, porcinos, haras, pesqueras, molinos, fábricas de alimentos, supermercados y otros.

RECOMENDACIONES DE USO

TRATAMIENTO RESIDUAL SOBRE SUPERFICIES

INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACION	DOSIFICACION DEL PRODUCTO	DILUIR EN	AREA A CUBRIR
VOLADORES MOSCAS ZANCUDOS, AVISPAS, POLILLAS, TABANOS Y OTROS	INTERIOR	20 - 30 cc.	5 Lt. de agua	100 m ²
	EXTERIOR	30 cc.	5 Lt. de agua	100 m ²
RASTREROS BARATAS, TIJERETAS, HORMIGAS, GARRAPATAS, PULGAS Y OTROS	INTERIOR	30 - 40 cc.	5 Lt. de agua	100 m ²
	EXTERIOR	40 cc.	5 Lt. de agua	100 m ²

OBSERVACIONES

- Este envase cubre de 2.500 a 5.000 m² de superficie.
- Aplicar sobre las superficies donde se posan o transitan los insectos.
- Mojar la superficie hasta humedecer completamente, evitando el escurrimiento o chorreo.
- Para un óptimo resultado, considerar la capacidad de absorción de la superficie donde se aplica la pulverización.
- Al utilizar equipos Ultra-Bajo Volumen (UBV), considerar la cantidad de agua en que se diluye la dosis recomendada, según el tipo de equipo a utilizar.

TRATAMIENTO EN ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS

INSECTOS A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	LUGAR DE APLICACION	DOSIS DEL PRODUCTO	DILUIR EN	AREA A CUBRIR
TODAS LAS PLAGAS DE VOLADORES Y RASTREROS	Ultra - Bajo Volumen (manual)	INTERIOR	15 cc.	2 Lt. de agua	1.000 m ³
		EXTERIOR	20 cc.	1 Lt. de agua o kerosene	10.000 m ²
	Nebulización Térmica (manual)	INTERIOR	15 cc.	1 Lt. de agua, diesel o kerosene	1.000 m ³
		EXTERIOR	20 cc.	2 Lt. de agua, diesel o kerosene	10.000 m ²

OBSERVACIONES

- Para lograr la máxima eficacia en aplicaciones exteriores, la velocidad del viento no debe ser superior a 5 km/h.
- El volumen a usar para diluir y el régimen de descarga, están dados por el tipo de equipo a utilizar.

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

CUIDADO

